

**Příbalová informace pro pacienty. Informace pro použití, čtěte pozorně!**

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE**

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek**

**MALTOFER tablety užívat**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

**V příbalové informaci naleznete:**

- 1. Co je MALTOFER tablety a k čemu se používá**
- 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MALTOFER tablety užívat**
- 3. Jak se MALTOFER tablety užívají**
- 4. Možné nežádoucí účinky**
- 5. Uchovávání přípravku MALTOFER tablety**
- 6. Další informace**

**MALTOFER tablety**

**žvýkací tablety**

*(Polymaltosum ferricum)*

Léčivá látka: *Polymaltosum ferricum* – 1 tableta obsahuje 357 mg polymaltosum ferricum, ekvivalent 100 mg trojmocného železa.

Pomocné látky: Dextrát, mikrokrystalická celulóza, kakao, natrium-cyklamát, makrogol 6000, mastek, vanilin a čokoládové aroma.

**Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:**

Vifor France SA  
7-13, Bd Paul Emile Victor  
92200 Neuilly-sur-Seine  
Francie

### **1. CO JSOU MALTOFER tablety a K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ**

MALTOFER tablety se užívají k léčbě a prevenci nedostatku železa v organismu.

### **2. DŘÍVE NEŽ ZEČNETE UŽÍVAT MALTOFER tablety**

**Neužívejte MALTOFER tablety:**

- Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku ( polymaltosum ferricum) nebo na kteroukoliv další složku přípravku Maltofer tablety
- Jestliže trpíte nadměrným množstvím železa ve tkáních (onemocnění se nazývá hemochromatóza, hemosideróza)
- Jestliže trpíte poruchou využití železa např. anémie (chudokrevnost) z otravy olovem, sideroachrestická anémie, talasemie

- Jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa (např. hemolytická anémie).

#### **Zvláštní pozornosti při užívání Maltofer tablety je zapotřebí:**

- Jestliže trpíte diabetem, jedna tableta obsahuje 0.36 g sacharidů

#### **Užívání Maltofer tablety s jídlem a pitím:**

Maltofer tablety můžete užívat společně s jídlem nebo ihned po jídle.

#### **Těhotenství**

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

#### **Kojení**

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

#### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Maltofer tablety nemají vliv na řízení motorových vozidel ani na obsluhu strojů.

#### **Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:**

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

### **3. JAK SE MALTOFER tablety UŽÍVAJÍ**

Vždy užívejte přípravek Maltofer tablety podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Maltofer tablety je:

Děti (ve věku 12 let a výše), dospělí a kojící matky:

Jedna tableta jednou až třikrát denně po dobu 3 až 5 měsíců. Po úpravě hemoglobinu k normálním hodnotám by měla léčba pokračovat po dobu několika týdnů 1 tabletou denně, aby byly doplněny zásoby železa.

Těhotné ženy:

Jedna tableta dva až třikrát denně. Po úpravě hemoglobinu k normálním hodnotám by měla léčba pokračovat 1 tabletou denně nejméně do konce těhotenství, aby byly doplněny zásoby železa.

Denní dávka může být rozdělena do jednotlivých dávek nebo může být užitá najednou.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Maltofer tablety je příliš silný nebo slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

#### **Jestliže jste užil (a) přípravku Maltofer tablety více než jste měl (a):**

Až dosud nebyly po požití vyšších dávek hlášeny případy otravy nebo nadměrná zátěž organismu železem.

#### **Jestliže jste zapomněl (a) užít Maltofer tablety.**

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil (a) vynechanou dávku.

### **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Podobně jako všechny léky, může mít i Maltofer tablety nežádoucí účinky.

Velmi vzácně se mohou objevit zažívací potíže jako je pocit plnosti, tlak v nadbřišku, nevolnost, zácpa nebo průjem.

Tmavé zbarvení stolice je způsobeno přítomností železa a není klinicky významné.

Maltofer tablety nepůsobí zbarvení zubní skloviny.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

## **5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU MALTOFER tablety**

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

## **6. DALŠÍ INFORMACE**

Testy zjišťující skryté krvácení do zažívacího traktu mohou být při současném podávání léčivého přípravku falešně pozitivní.

Velikost balení: 30 tablet

Datum revize textu : 3.3.2009