

Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně!

VERCEF 125 mg/5 ml
VERCEF 250 mg/5 ml
(Cefaclorum)
zrněný prášek pro přípravu perorální suspenze

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ranbaxy (UK) Ltd, Londýn, Velká Británie

Výrobce:

Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cashel, Co. Tipperary, Irsko
Cemelog BRS Kft., Budaörs, Maďarsko

Složení:

Léčivá látka:

Cefaclorum monohydricum 131,12 mg, odpovídá cefaclorum 125 mg (Vercef 125 mg/5 ml) nebo 262,24 mg, odpovídá cefaclorum 250 mg (Vercef 250 mg/5 ml) v 5 ml suspenze (1 čajová lžička).

Pomocné látky:

Xanthanová klovatina, natrium-benzoát, sacharóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, červeň allura AC, jahodové aroma, citronan sodný, kyselina citronová, simetikonová emulze.

Indikační skupina:

Antibiotikum.

Charakteristika:

Léčivá látka je cefalosporinové antibiotikum určené k léčbě bakteriálních infekčních onemocnění, a to hlavně infekcí, u nichž nejsou dostatečně účinná jiná běžná antibiotika.

Indikace:

Přípravek se užívá u dospělých a dětí od druhého měsíce věku při léčbě bakteriálních infekcí dýchacích cest včetně zánětu průdušek, zápalu plic, zánětu hltanu, anginy a zánětů vedlejších dutin nosních. Dále se užívá při léčbě zánětů středního ucha, při léčbě infekcí kůže a měkkých tkání a při léčbě infekcí močových cest.

Kontraindikace:

Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na cefaklor a ostatní cefalosporiny a při přecitlivělosti na pomocné látky přípravku.

Při přecitlivělosti na peniciliny smí být přípravek užíván jen tehdy, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. Rovněž pacienti, kteří prodělali v minulosti zánět střev a dále těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat jen ze zvlášť závažných důvodů.

Přípravek se nepodává kojencům mladším než 1 měsíc.

Nežádoucí účinky:

Může se vyskytnout průjem, nucení na zvracení, zvracení, výtok z pochvy nebo svědění pochvy. Vzácně se mohou vyskytnout závratě, nespavost nebo ospalost, nervozita a u dětí hyperaktivita. Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Při výskytu alergické reakce (kopřivka, kožní vyrážky, svědění kůže nebo ztížené dýchání) přerušete okamžitě užívání přípravku (jeho podávání dítěti) a neprodleně se poradíte s lékařem.

Interakce:

Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem neužívejte současně s Vercefem žádný volně prodejný lék. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat nějaký další lék, informujte ho, že již používáte Vercef.

Probenecid snižuje vylučování léčivé látky ledvinami a může tak prodloužit účinnost přípravku. Vercef může zvýšit účinek warfarinu (léčivo snižující srážlivost krve).

Dávkování a způsob použití:

Dávkování a délku léčby určí vždy lékař.

Dospělí

Dospělí obvykle užívají 3krát denně v pravidelných osmihodinových intervalech 250 mg cefacloru, tj. 5 ml = 1 čajovou lžičku přípravku Vercef 250 mg/5 ml. Lékař může podle potřeby jednotlivou dávku zvýšit na 500 mg cefakloru, tj. 10 ml = 2 čajové lžičky přípravku Vercef 250 mg/5 ml 3krát denně po 8 hodinách.

Děti

Dětem se podává přípravek Vercef 125 mg/5 ml v dávce odpovídající 20 mg cefacloru na 1 kg tělesné hmotnosti a den, rozdělené do tří dílčích dávek podávaných v pravidelných osmihodinových intervalech.

- Děti od 1 měsíce do 1 roku (do 9 kg tělesné hmotnosti): 2,5 ml = 1/2 čajové lžičky 3krát denně po 8 hodinách.

- Děti od 1 roku do 5 let: (tělesná hmotnost 9-18 kg) 5 ml = 1 čajová lžička 3krát denně po 8 hodinách.

- Děti starší než 5 let: 5 ml = 1 čajová lžička 3krát denně po 8 hodinách.

U závažnějších infekcí (zánět středního ucha, zánět nosních a hlavových dutin) a infekcí vyvolaných bakteriemi málo citlivými na toto antibiotikum je možno podávat 40 mg cefacloru na 1 kg tělesné hmotnosti, 3krát denně po 8 hodinách. Přesné dávkování určí lékař podle věku a tělesné hmotnosti dítěte.

Přípravek se může užívat během jídla i v době mezi jídly. Užitá dávka se zapije tekutinou.

Před každým užitím se musí obsah lahvičky dobře protřepat.

Odměrování dávky je možné provádět i pomocí injekční stříkačky.

Po naředění vznikne červená suspenze s jahodovou příchutí.

Obvyklá délka léčby u dospělých i dětí je 7-14 dnů.

Upozornění:

Před případným odběrem krve na její vyšetření upozorněte lékaře, že užíváte (podáváte dítěti) přípravek Vercef.

Zapomenete-li užít či podat některou dávku, užijte ji nebo ji podejte dítěti co nejdříve a pak pokračujte v původním schématu užívání či podávání přípravku.

Přípravek musí být spotřebován do 14 dnů od jeho nařazení v lékárně.

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poradte s lékařem.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25° C v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí..

Po nařazení má být suspenze uchovávána v chladničce při teplotě 2-8° C a spotřebována v průběhu 14 dnů.

Varování:

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

50 g zrněného prášku pro přípravu 100 ml suspenze.

Datum poslední revize textu:

1.10. 2008